



# ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ 2 ขอย ศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10320

โทร 0-2716-6141-3 โทรสาร 0-2716-6144 กรุงเทพฯ 10311

## Royal College of Surgeons of Thailand

Royal golden Jubilee Building 2 Soi Soonvijai, New Petchaburi Road Bangkok 10300, Thailand

Tel 66-0-2716-6141-3 FAX 66 0-2716-6144 Bangkok 10300, Thailand

Email Address [rcst@surgeons.or.th](mailto:rcst@surgeons.or.th) Website [www.surgeons.or.th](http://www.surgeons.or.th)

แนวทางการรักษาพยาบาลด้านศัลยกรรม CLINICAL PRACTICE GUIDELINES IN SURGERY

สาขา: ศัลยศาสตร์ทรวงอก

### เรื่อง: โรคหลอดลมโป่งพอง

นิยาม :

ภาวะหลอดลมโป่งพอง (bronchiectasis) อย่างเรื้อรัง.

การวินิจฉัย ประกอบด้วย การค้นหาหลักฐานสนับสนุนดังนี้

#### 1. ประวัติปัจจุบันและประวัติอดีต

ไอเป็นหนองจำนวนมากบ่อยๆ, ไอเป็นเลือด.

มีประวัติ สำลักหรือมีสิ่งแปลกปลอมในทางเดินหายใจ.

เคยเป็น mucoviscidosis.

Kartagener's syndrome, agammaglobulinemia.

Corpulmonale.

ฝีในสมอง, ฝีในปอด, หนองในช่องเยื่อหุ้มปอด.

การติดเชื้อทางเดินหายใจบ่อยๆ.

#### 2. การตรวจร่างกาย

พินู , sinusitis, cyanosis, clubbing of fingers, หายใจมีกลิ่นเหม็น, เคาะที่บริเวณที่มีพยาธิสภาพ, ฟังได้ rales และ rhonchi การเคลื่อนไหวของทรวงอกน้อยลง.

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

#### 1. การตรวจที่ควรทำ

ภาพถ่ายรังสีทรวงอกทำหน้า-หลัง และด้านข้าง.

CBC, urinalysis.

การส่งเสมหะไปเพาะหาเชื้อ และทดสอบความไวของเชื้อต่อยาปฏิชีวนะ.

การทดสอบทางชีวเคมี.

## 2. การตรวจตามข้อบ่งชี้

การทดสอบสมรรถภาพของปอด.

Tomography.

Bronchography.

คลื่นไฟฟ้าหัวใจ.

การตรวจวิเคราะห์แก๊สในเลือด.

### การตรวจพิเศษ

Bronchograms.

Bronchoscopy.

Pulmonary angiograms.

Selective arteriograms.

CT scan.

Aortogram.

### การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

อายุรแพทย์ทรวงอก อายุรแพทย์ รังสีแพทย์ วิศวณูแพทย์ กายภาพบำบัด แพทย์เวช  
ศาสตร์ฟื้นฟู.

หน่วยบำบัดเฉพาะทาง (ตามความจำเป็น)

กายภาพบำบัด.

### ข้อบ่งชี้เพื่อรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล

เมื่อรักษาทางยาเต็มที่แล้วกลับเป็นซ้ำอีก.

ไม่สามารถควบคุมภาวะติดเชื้อได้ ด้วยการรักษาแบบผู้ป่วยนอก.

ไอเป็นเลือด.

### การพยาบาลในหอผู้ป่วยหนัก

ตามความจำเป็น.

การให้ยา (ตามความจำเป็น)

ยาปฏิชีวนะ.

สารละลายทางหลอดเลือด.

Cardiorespiratory supportive drugs.

ยาแก้ปวด.

### การผ่าตัด

Lobectomy ขณะทำผ่าตัดให้ระวัง anomalous artery ออกจาก aorta มายังปอดส่วน นั้น เพราะอาจทำให้เสียเลือดได้อย่างรุนแรง.

ระยะเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาล โดยทั่วไป หลังผ่าตัด 7-14 วัน

#### การดำเนินโรค

บันทึกการเปลี่ยนแปลงหลังผ่าตัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การไอ การหายใจ ปัญหาการ ติดเชื้อของปอด.

#### ข้อบ่งชี้ในการจำหน่าย

แผลผ่าตัดหายดี ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ที่จำเป็นต้องอยู่โรงพยาบาล.

#### การดูแลผู้ป่วยหลังจำหน่าย

นัดตรวจภายใน 14-30 วัน หลังจากออกจากโรงพยาบาล.

การตรวจร่างกาย การถ่ายภาพรังสีทรวงอก การตรวจเลือด CBC และตรวจติดตาม ต่อไปเป็นระยะ ๆ จนสภาพของผู้ป่วยเป็นที่พอใจ.

CPG-S code : 23T99

#### Correspondence

นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ

นพ.ทวิสิน ต้นประยูร

ฝ่ายวิชาการ รวสท.

แนวทางการรักษาพยาบาลด้านศัลยกรรมนี้ จัดทำขึ้น โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ แต่ละสาขาได้ ร่วมกันให้ความคิดเห็น ร่าง แก้ไข สรุป และจัดทำเป็นเอกสาร โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ศัลยแพทย์ และ แพทย์ทั่วไปได้ใช้เป็นหลักในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านศัลยกรรมที่พบบ่อยและ หรือ มีความสำคัญ กับ เป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้ทันต่อยุคสมัย เพื่อให้การรักษา มีมาตรฐานจัดทำขึ้นในลักษณะของ **managed care guideline** มิใช่ตำราและห้ามนำไปใช้อ้างอิงในทางอื่น โดยมีได้รับอนุญาตจากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ แห่งประเทศไทย